

ดาตา 5 ปี กับสุนัขกัด



ปี 1

อย่าเหยย

สุนัขให้โมโห



ปี 2

อย่าเหยยบ

หาง หัว ตัว ขา หรือ
ทำให้สุนัขขตกใจ



ปี 3

อย่าแยก


สุนัขที่กำลังกัดกัน
ด้วยมือเปล่า



ปี 4

อย่าหยิบ

จานข้าวหรือเค็ลื้อนย้ายอาหาร
ขณะสุนัขกำลังกินอาหาร



ปี 5

อย่ายุ่ง

หรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จัก
หรือไม่มีเจ้าของ

เมื่อถูกสุนัขรื้อแถม กัด ข่วน

ต้องทำดังนี้


1

ล้างแผลให้สะอาด
ด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้ง
ให้ถึงก้นแผล
ล้างสบู่ออกให้หมด
เช็ดแผลให้แห้ง
ใส่ยารักษาแผลสด




2

จัดจำสัตว์ที่กัดให้เคเพื่อ
สืบหาเจ้าของ/ักหมา
ไว้ดูอาการ 10 วัน
สอบถามประวัติ
การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า



3



ไปหาหมอหรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เพื่อรับการป้องกันที่ถูกต้อง




สุนัขกัด ต้องล้างแผล ใส่ยา ักินหมอ
จนหมอ จัดฉัดวัคซีนจนครบชุด

โรคพิษสุนัขบ้า

ป้องกันและหลีกเลี่ยง
ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด



แพทย์โรคพิษสุนัขบ้า
เลี้ยงน้องหมาอย่างถูกวิธี
Understand it to defeat it




“ปีหนึ่งคนไทยถูกสุนัขกัด ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน”



โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสที่เป็นอันตรายร้ายแรง โดยเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล รอยขีดข่วน หรือรอยกัด โดยเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล รอยขีดข่วน หรือรอยกัด

การติดต่อ



คนและสัตว์ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ เมื่อถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัดหรือข่วน โดยเชื้อจะอยู่ในน้ำลาย ถ้าเป็นสุนัขและแมว จะพบว่าเมื่อเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ออกมากับน้ำลายตั้งแต่ก่อนแสดงอาการ 1-7 วัน

“โรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายได้”

อาการที่พบในคน

ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวของโรค ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ - 6 เดือน แต่บางรายมีระยะฟักตัวสั้นมากไม่ถึงสัปดาห์ หรืออาจนานเกิน 1 ปี อาการเริ่มแรกคือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัดแล้วลามไปส่วนอื่น กระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพื่อเจ้อกลิ่นลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลืนน้ำ ปวดท้องน้อยและขากลิ้นเนื้อกระตุก แขนขาอ่อนแรง หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาตหมดสติ และตายในที่สุด

อาการที่พบในสุนัข

ระยะฟักตัวของโรคหลังจากถูกกัดหรือข่วน จะอยู่ในช่วง 3 - 8 สัปดาห์ ไม่เกิน 6 เดือน และจะตายภายใน 10 วัน หลังจากแสดงอาการ ซึ่งมีทั้งแบบดุร้าย และแบบซึม โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะแรก

สุนัขจะมีอาการผิดปกติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ระยะตื่นเต้น

สุนัขเริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวายตื่นเต้น หงุดหงิดไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของไม่เลือก ม้วนตัวขยายกวาง

ระยะอัมพาต

สุนัขมีอาการค้างห้อยตก ลิ้นสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปาก น้ำลายไหล ขย่อนอาหารคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ย พรังตัวไม่ได้ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด

คำแนะนำ

สำหรับคนเลี้ยงสุนัข

1. นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี (ปีแรกควรรฉีด 2 ครั้ง)

2. ไม่ปล่อยสุนัขไปพ่นพางในที่สาธารณะ ทุกครั้งที่นำสุนัขออกนอกบ้าน ต้องอยู่ในสายจูง

3. ไม่นำสุนัขไปปล่อย และต้องคุมกำเนิด ไม่ให้ผสมพันธุ์มากเกินไป

หยุดปล่อยหมา
หยุดปัญหาหมาจรจัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย